

CRITERII DE PRIORITIZARE SI GRILA SCOR PRIORITIZARE

Pentru anumite DCI-uri notate cu (***) prevazute de HG.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

SUBLISTA B (tulburari de crestere si tulburari de pubertate):

SOMATROPINUM:

Initiere tratament:

1. In functie de deficitul statural(deviatii standard DS):

Nr. Crt.	Deviatii standard	Scor(puncte)
1.	4-6	10
2.	2,5-3	5

II. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Evolutia bolii:

Nr. Crt.	Evolutia bolii	Scor(puncte)
1.	satisfacator	10
2.	stationar	5

TRIPTORELINUM:

Initiere tratament:

1. In functie de varsta si sex:

Nr. Crt.	Varsta si sex	Scor(puncte)
1.	0-7ani(fetite) si 0-8ani(baieti)	10
2.	7-8ani(fetite) si 8-9ani(baieti)	5

II. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Evolutia bolii:

Nr. Crt.	Evolutia bolii	Scor(puncte)
1.	satisfacator	10
2.	stationar	5

SUBLISTA C3(tulburari de comportament cu deficit de atentie si sindrom hiperkinetic):

METHILFENIDATUM/ ATOMOXETINUM:

I.Evolutia bolii:

Nr. Crt.	Evolutia bolii	Scor(puncte)
1.	satisfacator	15
2.	stationar	10
3.	nesatisfacator	5

II. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

G10(leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice):

ANAGRELIDUM

Initiere tratament:

I.Criterii paraclinice(in functie de numarul de trombocite):

Nr. Crt.	Nr. de trombocite/mmc	Scor(puncte)
1.	> 1.000.000/mmc	10
2.	< 1.000.000/mmc	5

II.Episoade trombotice in antecedente:

Nr. Crt.	Episoade trombotice	Scor(puncte)
1.	prezente	10
2.	absente	5

III.Raspunsul la terapia cu Hydrea dupa minim 1 luna de tratament la doze maxime terapeutice.

Nr. Crt.	Nr. de trombocite/mmc	Scor(puncte)
1.	dublarea numarului de trombocite	5

IV. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Raspunsul terapeutic:

Nr. Crt.	Nr. de trombocite/mmc	Scor(puncte)
1.	scaderea cu 50% a numarului de trombocite dupa prima luna de tratament	5
2.	ulterior mentinerea numarului de trombocite sub 600.000/mmc	5

DEFERASIROXUM

I.Prognosticul bolii:

Nr. Crt.	Prognostic	Scor(puncte)
1.	nefavorabil	10
2.	favorabil	5

II. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

EPOETINUM/ DARBEPOETINUM

Initiere tratament:

I.Criterii paraclinice(in functie de valorile Hemoglobinei):

Nr. Crt.	Valori Hemoglobina(g/dl)	Scor(puncte)
1.	9-10 g/dl	15
2.	8-9 g/dl	10
3.	10-11 g/dl	5

II.Prognosticul bolii:

Nr.	Prognostic	Scor(puncte)
-----	------------	--------------

Crt.		
1.	favorabil	10
2.	nefavorabil	5

III. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Criterii paraclinice(in functie de valorile Hemoglobinei):

Nr. Crt.	Valori Hemoglobina(g/dl)	Scor(puncte)
1.	<12 g/dl	5

II.Raspunsul terapeutic:

Nr. Crt.	Valori Hemoglobina(g/dl)	Scor(puncte)
1.	cresterea valorii Hb cu cel putin 0,5 g/dl pe luna.	5

G11(epilepsie)

GABAPENTINUM/PREGABALINUM

Initiere tratament:

I.Frecventa crizelor:

Nr. Crt.	Nr. de crize	Scor(puncte)
1.	> 2 crize/saptamana	10
2.	< 2 crize/luna	5

II.Aspectul EEG intercritic:

Nr. Crt.	Aspectul EEG intercritic	Scor(puncte)
1.	iritativ	10
2.	normal	5

III.Raspunsul la alte terapii dupa minim 1 luna de tratament la doze maxime terapeutice.

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

IV. Eficienta tratamentului in functie de varsta si sex:

Nr. Crt.	Varsta si sex	Scor(puncte)
1.	<45 ani la femei	15
2.	<60 ani	10
3.	>60 ani	5

V. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Frecventa crizelor:

Nr. Crt.	Nr. de crize	Scor(puncte)
1.	Scaderea nr. de crize cu cel putin 1/saptamana	10
2.	Scaderea nr. de crize cu cel putin 1/luna	5

II. Aspectul EEG intercritic

Nr. Crt.	Aspectul EEG intercritic	Scor(puncte)
1.	ameliorarea aspectului EEG intercritic	5

G12(boala Parkinson)

ENTACAPONUM/COMBINATII

Initiere tratament:

I.Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF:

Nr. Crt.	Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	prezente	5
2.	absente	0

II.Scorul HOEHN-YAHR:

Nr. Crt.	Scorul HOEHN-YAHR	Scor(puncte)
1.	1-4	10
2.	5	5

III.Raspunsul la terapia cu Levodopa dupa atingerea dozelor maxime terapeutice:

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

IV. Eficienta tratamentului in functie de varsta :

Nr. Crt.	Varsta	Scor(puncte)
1.	<60 ani	10
2.	>60 ani	5

V. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF:

Nr. Crt.	Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	absente	5
2.	prezente	0

II.Fenomene WEARING OFF:

Nr. Crt.	Fenomene WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	prelungit mai mult de 4-5 ore	5

II.Scorul HOEHN-YAHR:

Nr. Crt.	Scorul HOEHN-YAHR	Scor(puncte)
1.	Scadere scor cu cel puțin o unitate	5

RASAGILINUM

Initiere tratament:

I.Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF:

Nr. Crt.	Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	prezente	5
2.	absente	0

II.Scorul HOEHN-YAHR:

Nr. Crt.	Scorul HOEHN-YAHR	Scor(puncte)
1.	1-4	10
2.	5	5

III. Raspunsul la alte terapii dupa minim 3 luni de tratament la doze maxime terapeutice:

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

IV. Eficienta tratamentului in functie de varsta :

Nr. Crt.	Varsta	Scor(puncte)
1.	<60 ani	10
2.	>60 ani	5

V. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau**Continuare tratament:****I.Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF:**

Nr. Crt.	Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	absente	5
2.	prezente	0

II.Fenomene WEARING OFF:

Nr. Crt.	Fenomene WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	prelungit mai mult de 4-5 ore	5

II.Scorul HOEHN-YAHR:

Nr. Crt.	Scorul HOEHN-YAHR	Scor(puncte)
1.	Scadere scor cu cel putin o unitate	5

ROTIGOTINUM**Initiere tratament:****I.Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF:**

Nr. Crt.	Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	prezente	5
2.	absente	0

II.Scorul HOEHN-YAHR:

Nr. Crt.	Scorul HOEHN-YAHR	Scor(puncte)
1.	1-4	10
2.	5	5

III. Criterii clinice:

Nr. Crt.	Criterii clinice	Scor(puncte)
1.	Intoleranta gastrointestinala si tulburari de deglutitie	10
2.	Intoleranta gastrointestinala fara tulburari de deglutitie	5

IV. Raspunsul la alte terapii dupa minim 3 luni de tratament la doze maxime terapeutice:

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

IV. Eficienta tratamentului in functie de varsta :

Nr. Crt.	Varsta	Scor(puncte)
----------	--------	--------------

1.	<60 ani	10
2.	>60 ani	5

VI. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF:

Nr. Crt.	Fenomene ON/OFF +/- WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	absente	5
2.	prezente	0

II.Fenomene WEARING OFF:

Nr. Crt.	Fenomene WEARING OFF	Scor(puncte)
1.	prelungit mai mult de 4-5 ore	5

III.Scorul HOEHN-YAHR:

Nr. Crt.	Scorul HOEHN-YAHR	Scor(puncte)
1.	Scadere scor cu cel puțin o unitate	5

G16(demente:degenerative, vasculare, mixte):

DONEPEZILUM/ RIVASTIGMINUM/ GALANTAMINUM

Initiere tratament:

I.In functie de scorul MMSE:

Nr. Crt.	Scorul MMSE	Scor(puncte)
1.	15-18	10
2.	19-23	5

II.Raspunsul la alte terapii dupa minim 3 luni de tratament la doze maxime terapeutice.

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

III. Eficienta tratamentului in functie de varsta:

Nr. Crt.	Varsta	Scor(puncte)
1.	50-60 ani	15
2.	60-70 ani	10
3.	>70 ani	5

IV. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I. In functie de scorul MMSE:

Nr. Crt.	Scorul MMSE	Scor(puncte)
1.	mentinerea scorului MMSE	5

MEMANTINUM

Initiere tratament:

I.In functie de scorul MMSE:

Nr. Crt.	Scorul MMSE	Scor(puncte)
1.	13-15	10
2.	9-12	5

II. Raspunsul la alte terapii dupa minim 3 luni de tratament la doze maxime terapeutice.

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

III. Eficienta tratamentului in functie de varsta:

Nr. Crt.	Varsta	Scor(puncte)
1.	50-60 ani	15
2.	60-70 ani	10
3.	>70 ani	5

IV. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau**Continuare tratament:****I. In functie de scorul MMSE:**

Nr. Crt.	Scorul MMSE	Scor(puncte)
1.	mentinerea scorului MMSE	5

P3(Programul national de oncologie):**INTERFERONUM****Initiere tratament:****I. Pacienti diagnosticati cu cancer renal:**

Nr. Crt.	Pacienti diagnosticati cu cancer renal	Scor(puncte)
1.	In tratament cu Bevacizumabum	5

II. Status de performanta:

Nr. Crt.	Status de performanta	Scor(puncte)
1.	ECOG 0/1	10
2.	ECOG >/=2	5

III. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau**Continuare tratament:****I. Status de performanta:**

Nr. Crt.	Status de performanta	Scor(puncte)
1.	mentinerea statusului de performanta	5

FILGRASTINUM/PEGFILGRASTINUM**Initiere tratament:****I. Criterii clinice:**

Nr. Crt.	Criterii clinice	Scor(puncte)
1.	febra >38 grade C dupa cel putin un ciclu de chimioterapie	5

II. Criterii paraclinice:

Nr. Crt.	Criterii paraclinice	Scor(puncte)
1.	nr. leucocite<500/mmc si nr. neutrofile<200/mmc	10
2.	nr. leucocite<1000/mmc si nr. neutrofile<600/mmc	5

III. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.Pacient in tratament cu citostatice:

Nr. Crt.	Tratament	Scor(puncte)
1.	citostatice	5

II. Criterii paraclinice:

Nr. Crt.	Criterii paraclinice	Scor(puncte)
1.	nr. leucocite si nr. neutrofile in limite normale	5

P5(Programul national de diabet zaharat):

EXENATIDUM

Initiere tratament:

I.In functie de valorile HbA1C:

Nr. Crt.	In functie de valorile HbA1C	Scor(puncte)
1.	>8%	15
2.	7,5-8%	10
3.	7-7,5%	5

II.Criterii clinice(in functie de valorile IMC):

Nr. Crt.	In functie de valorile IMC	Scor(puncte)
1.	>35 kg/mp	15
2.	30-35 kg/mp	10
3.	25-29 kg/mp	5

III.Raspunsul la alte terapii dupa minim 3 luni de tratament la doze maxime terapeutice:

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

IV. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.In functie de valorile HbA1C:

Nr. Crt.	In functie de valorile HbA1C	Scor(puncte)
1.	<7% dupa maxim 6 luni de tratament	5

II.Criterii clinice(in functie de valorile IMC):

Nr. Crt.	In functie de valorile IMC	Scor(puncte)
1.	scadere ponderala	5

ROSIGLITAZONUM/PIOGLITAZONUM/COMBINATII(Rosiglitazon+Metformin; Rosiglitazonum+Glimepiridum; Pioglitazonum+Metforminum)

Initiere tratament:

I.In functie de valorile HbA1C:

Nr. Crt.	In functie de valorile HbA1C	Scor(puncte)
----------	------------------------------	--------------

1.	>8%	15
2.	7,5-8%	10
3.	7-7,5%	5

II.Criterii clinice(in functie de valorile IMC):

Nr. Crt.	In functie de valorile IMC	Scor(puncte)
1.	>35 kg/mp	15
2.	30-35 kg/mp	10
3.	25-29 kg/mp	5

III.In functie de valorile trigliceridelor si HDL-colesterol:

Nr. Crt.	In functie de valorile TG si HDL-colesterol	Scor(puncte)
1.	Tg>200 mg/dl si HDL-colesterol<35 mg/dl	5

IV.Raspunsul la alte terapii dupa minim 3 luni de tratament la doze maxime terapeutice:

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

V. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.In functie de valorile HbA1C:

Nr. Crt.	In functie de valorile HbA1C	Scor(puncte)
1.	<7% dupa maxim 6 luni de tratament	5

SITAGLIPTINUM

Initiere tratament:

I.In functie de valorile HbA1C:

Nr. Crt.	In functie de valorile HbA1C	Scor(puncte)
1.	>8%	15
2.	7,5-8%	10
3.	7-7,5%	5

II.Raspunsul la alte terapii dupa minim 3 luni de tratament la doze maxime terapeutice:

Nr. Crt.	Raspuns la terapii	Scor(puncte)
1.	non responder	5

III. Data înregistrării dosarelor la CAS Bacau

Continuare tratament:

I.In functie de valorile HbA1C:

Nr. Crt.	In functie de valorile HbA1C	Scor(puncte)
1.	<7% dupa maxim 6 luni de tratament	5